

DATOS IMPORTANTES

Este es solo un breve resumen de información importante sobre TUKYSA. Hable con su proveedor de atención médica o farmacia para obtener más información.

ACERCA DE TUKYSA

TUKYSA es un medicamento con receta que se usa con los medicamentos trastuzumab y capecitabina para tratar adultos con cáncer de mama positivo para el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2) que se ha diseminado a otras partes del cuerpo, como el cerebro (metastásico), o que no puede extirparse mediante cirugía y que han recibido uno o más tratamientos contra el cáncer de mama HER2.

Se desconoce si TUKYSA es seguro y eficaz en niños.

Información importante: Lea también la Guía del medicamento de capecitabina.

ANTES DE TOMAR TUKYSA

Informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, lo que incluye si:

- Tiene problemas hepáticos.
- Está embarazada o planea quedar embarazada. TUKYSA puede dañar al feto.

Mujeres que pueden quedar embarazadas:

- Su proveedor de atención médica le realizará una prueba de embarazo antes de comenzar el tratamiento con TUKYSA.
- Use un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con TUKYSA y durante al menos 1 semana después de la última dosis de TUKYSA. Hable con su proveedor de atención médica sobre los métodos anticonceptivos que puede usar durante este tiempo.
- Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si queda embarazada o cree que puede estarlo durante el tratamiento con TUKYSA.

Hombres con parejas de sexo femenino que pueden quedar embarazadas:

- Use un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con TUKYSA y durante al menos 1 semana después de la última dosis de TUKYSA.
- Está amamantando o planea amamantar. No amamante durante el tratamiento con TUKYSA ni durante al menos 1 semana después de la última dosis de TUKYSA.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los de venta con receta y de venta sin receta, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

- TUKYSA puede afectar la manera en que actúan sus otros medicamentos, y otros medicamentos pueden afectar la forma en que actúa TUKYSA.
- Mantenga una lista de todos los medicamentos que toma y muéstresela a su proveedor de atención médica y farmacia cada vez que agregue un medicamento nuevo.

CÓMO TOMAR TUKYSA

- Tome TUKYSA 2 veces al día con o sin alimentos.
- Tome TUKYSA con alrededor de 12 horas de diferencia o a la misma hora todos los días.
- Trague los comprimidos de TUKYSA enteros. No mastique, triture ni parta los comprimidos. No tome los comprimidos de TUKYSA si están rotos, partidos o dañados.
- Si vomita u omite una dosis de TUKYSA, tome su siguiente dosis a la hora habitual.

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE TUKYSA

TUKYSA puede causar efectos secundarios graves, como:

- **Diarrea** (heces acuosas, blandas o frecuentes), que es frecuente y a veces puede ser grave.
 - La diarrea grave puede provocar la pérdida de demasiado líquido corporal (deshidratación), presión arterial baja, problemas renales y la muerte.
 - Informe a su proveedor de atención médica si tiene un cambio en las deposiciones o diarrea grave. Su proveedor de atención médica puede recetarle medicamentos para tratar la diarrea durante el tratamiento con TUKYSA.
- **Problemas hepáticos**, incluso casos graves. Su proveedor de atención médica le hará un análisis de sangre para controlar su función hepática antes de comenzar con TUKYSA y cada 3 semanas durante el tratamiento con TUKYSA, o según sea necesario.

Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene signos o síntomas de problemas hepáticos, como picazón, color amarillento de la piel o los ojos, orina oscura o marrón (de color té), dolor en el costado superior derecho de la zona del estómago (abdomen), sensación de mucho cansancio, disminución del apetito, o aparición de sangrados o moretones con más facilidad que lo normal.

Los efectos secundarios más frecuentes de TUKYSA incluyen los siguientes:

- diarrea
- erupción cutánea, enrojecimiento, dolor, hinchazón o ampollas en las palmas de las manos o las plantas de los pies
- náuseas
- cansancio
- valores elevados en los análisis de sangre de la función hepática
- vómitos
- llagas en la boca (estomatitis)
- disminución del apetito
- dolor en la zona del estómago (abdomen)
- dolor de cabeza
- recuento bajo de glóbulos rojos (anemia)
- erupción cutánea

Su proveedor de atención médica puede cambiar su dosis de TUKYSA, suspender temporalmente o interrumpir permanentemente el tratamiento con TUKYSA si tiene determinados efectos secundarios.

TUKYSA puede causar problemas de fertilidad en hombres y mujeres, lo que puede afectar la capacidad de tener hijos. Consulte con su proveedor de atención médica si tiene dudas relacionadas con la fertilidad.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de TUKYSA. Llame a su médico para que le aconseje sobre los efectos secundarios.

OBTENER MÁS INFORMACIÓN

- Este es solo un breve resumen de información importante sobre TUKYSA. Hable con su proveedor de atención médica o farmacia para obtener más información.
- Vaya a www.TUKYSA.com o llame al **1-855-4SEAGEN**.
- Si necesita ayuda para pagar su medicamento, visite www.SeagenSecure.com para obtener información sobre el programa.